

# Arigo<sup>®</sup> 51 WG

## HERBICIDA

- Amplo espetro de controlo sobre as infestantes.
- Graças ao efeito sinérgico de nicossulfurão e rimsulfurão, é possível obter uma boa eficácia sobre gramíneas e *Sorghum hapelense* (sorgo-bravo).
- O efeito aditivo de nicossulfurão, rimsulfurão e mesotriona proporciona um amplo espetro de controlo de infestantes de folha larga.
- A mesotriona confere um excelente controlo de *Abutilon theophrasti* (malvão).



**Mais comodidade,  
mais eficácia**



### Controlo de infestantes

Infestantes gramíneas		Tamanho
<i>Echinochloa Crus-galli</i>	milhã pé-de-galo	Até 4 folhas
<i>Setaria sp.</i>	milhã verde	Até 3 folhas
<i>Digitaria sanguinalis</i>	milhã-digitada	Até 2 folhas
<i>Sorghum halepense</i>	sorgo-bravo	Até 20 cm de altura



### Momento de aplicação

- Flexibilidade de utilização: de 2 a 8 folhas de milho.



Infestantes de folha larga	
<i>Abutilon theophrasti</i>	malvão
<i>Amaranthus sp.</i>	brede
<i>Chenopodium album</i>	catassol
<i>Cirsium arvense</i>	cardo
<i>Datura stramonium</i>	figueira do inferno
<i>Galinsoga parviflora</i>	erva-da-moda
<i>Mercurialis annua</i>	urtiga-morta, erva-mercúrio
<i>Polygonum aviculare</i>	sanguinária
<i>Polygonum lapathifolium</i>	mal-casada
<i>Polygonum persicaria</i>	erva-pessequeira
<i>Senecio vulgaris</i>	tasneirinha
<i>Sinapis arvensis</i>	mostarda-dos-campos
<i>Solanum nigrum</i>	erva-moura
<i>Sonchus arvensis</i>	serralha-macia
<i>Stellaria media</i>	morugem
<i>Xanthium strumarium</i>	bardana-menor, xântio

### Composição:

nicossulfurão 12%/rimsulfurão 3%/mesotriona 36%

**Família química:** sulfonilureas: nicossulfurão e rimsulfurão/triquetonas: mesotriona

**Modo de ação:** sistémico. Absorção foliar e radicular

**Formulação:** granulado dispersível em água (WG)

**Cultura:** milho