

Exalt[®]

INSECTICIDA



- Novo inseticida: ativo por ingestão e contato.
- O melhor controlo de Lagartas, *Tuta*, Tripes, *Drosophila*.
- Potente efeito de choque.
- Modo de ação único, característico da família das espinosinas.



Rompe com o estabelecido

Atributos-chave:

- É um novo inseticida para hortícolas.
- Controla Lagartas, *Tuta*, Tripes e *Drosophila*.
- Apresenta potente atividade inseticida por ingestão e contato.
- Grande efeito de choque e ação translaminar.
- Atua sobre todos os estágios do inseto (ovos, larvas e adultos).
- A sua matéria ativa pertence à família das espinosinas (grupo IRAC 5).

Perfil toxicológico e ambiental favoráveis:


- Compatível com a fauna auxiliar.
- Baixa toxicidade para insetos predadores, antocorídeos, coccinelídeos, crisópidos,...
- Adequado para o uso em Produção Integrada.
- Perfil toxicológico e ambiental favoráveis.
- Para proteger as abelhas e outros insetos polinizadores, não aplicar durante a floração das culturas. Não utilizar onde houver abelhas em período de recolha de pólen. Retire ou cubra as colmeias durante o tratamento e nos 7 dias após o mesmo. Não aplicar quando as ervas daninhas estiverem em floração. Elimine as ervas daninhas antes da sua floração.



Exalt

Porquê tratar com Exalt no início das eclosões?

- Rápido efeito de choque contra larvas.
- Potente ação larvicida por ingestão e contato.
- Efeito ovo-larvicida e adulticida.
- Boa persistência.
- Flexibilidade de uso em diferentes programas.



Cultura	Praga	Dose/aplic. (L/ha)	Ar livre N.º Aplic.	Estufa N.º Aplic.	Intervalo mínimo entre aplic. (dias)	P.S. (dias)
Solanáceas: Tomate, pimento, beringela	Lagartas: <i>Spodoptera</i> , <i>Heliiothis</i> <i>Tuta absoluta</i> Tripes: <i>Frankliniella</i>	2,4	1	2-3*	14	3

(* Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura)



Cultura	Praga	Dose/aplic. (L/ha)	Ar livre N.º Aplic.	Estufa N.º Aplic.	Intervalo mínimo entre aplic. (dias)	P.S. (dias)
Cucurbitáceas: Pepino, abobrinha, abóbora, melão, melancia	Lagartas: <i>Spodoptera</i> , <i>Heliiothis</i> Tripes: <i>Frankliniella</i>	2,4	1	2-3*	14	3

(* Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura)



Cultura	Praga	Dose/ aplic. (L/ha)	Ar livre N.º Aplic.	Estufa N.º Aplic.	Intervalo mínimo entre aplic. (dias)	P.S. (dias)
Alface	Lagartas: <i>Spodoptera, Heliothis</i>	2,0	1	2-3*	14	3
Espinafre	Tripes: <i>Frankliniella</i>	2,0	1	----	----	3

(*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura



Cultura	Praga	Dose/ aplic. (L/ha)	Ar livre N.º Aplic.	Estufa N.º Aplic.	Intervalo mínimo entre aplic. (dias)	P.S. (dias)
Brassicas: Brócolos, couve-flor, couves-de-Bruxelas, repolho	Lagartas: <i>Mamestra, Pieris, Plutella</i>	2,0	1	----	----	7



Cultura	Praga	Dose/ aplic. (L/ha)	Ar livre N.º Aplic.	Estufa N.º Aplic.	Intervalo mínimo entre aplic. (dias)	P.S. (dias)
Morangos	<i>Drosophila suzukii</i> Lagartas: <i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i> Tripos: <i>Frankliniella</i>	2,0	1	2-3*	28	3
Mirtilos, groselha, framboesa	<i>Drosophila suzukii</i>	2,4	1	2	28	3

(*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura



Cultura	Praga	Dose/ aplic. (L/ha)	Ar livre N.º Aplic.	Estufa N.º Aplic.	Intervalo mínimo entre aplic. (dias)	P.S. (dias)
Ornamentais	Tripos: <i>Frankliniella</i> e outros	2,0	1	2	14	N.P.
Pequenas culturas - Cerefólio, Cebolinho, Aipo (folhas), Salsa - Salva, Alecrim, Tomilho, Manjeriço, Estragão, Louro	Lagartas: <i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i> Tripos: <i>Frankliniella</i>	2,0	1	2-3*	14	3

Ornamentais (Plantas para produção de folha, flor e/ou fruto – cortada ou em vaso –, árvores, arbustos e roseiras)

Pequenas culturas:

- (*) Máximo de 2 aplicações por praga e 3 para o conjunto de pragas por ciclo de cultura
- Tratamentos: Fevereiro–Novembro (na presença de praga)
- Ar livre: BBCH 11–49 (desde o desenvolvimento das folhas à colheita)
- Estufa: BBCH 11–89 (desde o desenvolvimento das folhas à colheita)

